

# COLINOX®

## Krople doustne

Zawiesina do stosowania w zaburzeniach czynnościowych układu pokarmowego

**Wskazania:** Preparat zalecany w leczeniu: wzdęć brzucha, aerofagii i kolek gazowych u niemowląt, dzieci i dorosłych, zaburzeń trawienia.

Zalecany we wszystkich przypadkach, w których wymagane jest skrócenie czasu opróżnienia żołądka.

Wspomaga leczenie *Helicobacter Pylorii*.

**Sposób użycia:** Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.

**Dorośli i dzieci:** Jeśli lekarz nie zaleci inaczej podawać doustnie 20 kropli, 2–4 razy dziennie najlepiej po jedzeniu. Można podawać z niewielką ilością płynu.

**Niemowlęta:** Jeśli lekarz nie zaleci inaczej podawać doustnie 10 kropli, 2–4 razy dziennie najlepiej po jedzeniu. Można podawać z niewielką ilością płynu.

**Działania niepożądane:** Nie stwierdzono.

**Skład:** Symetykon (emulsja 30%), zarodniki *Lactobacillus sporogenes* (minimum 1,5 Mld/g), fruktoza, benzoosan sodu, aromaty.

### Środki ostrożności:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Preparat zachowuje swoje pełne właściwości przez okres 30 dni po otwarciu opakowania bezpośredniego.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu wymienionych w ulotce.

W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Po użyciu butelkę dokładnie zamknąć.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Producent:  
D.M.G. Italia s.r.l.  
Via Laurentina Km. 26,700  
00040 Pomezia (RM) – Włochy

CE  
0373

